

Urocultivo

Indicaciones

Pacientes que controlan esfínteres

Debe hacerse una higiene de la zona genital, con agua y un jabón nuevo y enjuagar con abundante agua.

Si es mujer: colocarse un tapón vaginal para evitar contaminación con flujo y retirarlo después de recolectar la muestra de orina.

Si es hombre: retirar el prepucio para higienizarse.

Proceda luego a recoger la orina, destapando previamente el frasco SOLO EN EL MOMENTO DE LA MICCIÓN y sin tocar con los dedos su interior, coloque la tapa con el lado plano hacia abajo. Empiece a orinar en el inodoro y recoja en el frasco solo la parte media de la orina, NO DEBE RECOGER NI LA PRIMERA, NI LA ULTIMA PARTE DE L CHORRO DE ORINA. Llene solo la mitad del frasco. Cierre bien el frasco, ajustando la tapa, controlando que el recipiente no pierda y rotulelo con su nombre. Envíelo al laboratorio inmediatamente después de recogida la muestra (refrigerada), o si esto no es posible mantenerla en la heladera hasta el momento del envío.

Pacientes pediátricos o adultos que no controlan esfínteres

Intentar retener la orina el mayor tiempo posible. Realizar preparación, recolección y transporte según lo indicado anteriormente.

Dar de beber al paciente abundante agua o leche en el caso de lactantes. Es importante descartar que la recolección deberá realizarse al acecho, a la espera de la micción. Si esto no ocurre antes de los 30 minutos de realizarse la higiene, esta deberá repetirse.

Pacientes en quienes se solicita estudio de primer chorro de orina

Realizar la preparación como se indica anteriormente. Recoger la primera parte de la orina (primer chorro) y transportar como se indicó anteriormente.

Pacientes sondados

En el caso de tratarse de un paciente con sonda permanente, la toma debe realizarla un enfermero, por punción de sonda, previa desinfección con alcohol al 70 % primero y el alcohol yodado después (dejar secar el desinfectante antes de hacer punción)

Observaciones

Recomendamos respetar rigurosamente estas instrucciones.

Si la muestra no fuera apropiada, se solicitara una nueva muestra y se deberá repetir el estudio dentro de las 48 hs. del aviso. De demorarse la muestra, se solicitara una nueva orden medica.

Este estudio requiere que el paciente no se encuentre bajo tratamiento antibiótico durante las 48 hs. previas.

